




Областной центр
общественного здоровья
и медицинской профилактики

| profilaktica.ru



ПРОФИЛАКТИКА ТУБЕРКУЛЕЗА У ДЕТЕЙ

✓ В родильном доме детям проводится противотуберкулёзная внутрикожная вакцинация вакциной БЦЖ (или БЦЖ-М), сведения о ней зарегистрированы в учетной медицинской документации вашего ребёнка.


**НЕ ОТКАЗЫВАЙТЕСЬ
ОТ ВАКЦИНАЦИИ, ПРИ
ЗАРАЖЕНИИ ТУБЕРКУЛЕЗОМ
ОНА СОХРАНИТ
РЕБЕНКУ ЖИЗНЬ!**

✓ Далее в течение жизни ребенка ежегодно медицинскими работниками осуществляется диагностика туберкулёза, для чего проводится внутрикожная туберкулиновая проба Манту и проба с Диаскинтестом.

**ТУБЕРКУЛИН И ДИАСКИНТЕСТ
НЕ ОПАСНЫ ДЛЯ РЕБЕНКА!
ТУБЕРКУЛИНОДИАГНОСТИКА
ДО 7 ЛЕТ И ДИАСКИНТЕСТ
С 8 И ДО 14 ЛЕТ -
ЭТО ЕДИНСТВЕННЫЕ СПОСОБЫ,
КОТОРЫМИ МОЖНО ВЫЯВИТЬ
ТУБЕРКУЛЕЗНУЮ ИНФЕКЦИЮ
У ДЕТЕЙ.**

МЕСТО ВВЕДЕНИЯ ПРЕПАРАТА НА ПРЕДПЛЕЧЬЕ РЕБЁНКА НЕ СЛЕДУЕТ:

- ✗ смачивать водой,
- ✗ смазывать раствором йода или бриллиантового зелёного,
- ✗ бинтовать, заклеивать лейкопластырем.



Результаты внутрикожных проб оценивают **через 72 часа (3 суток)**. Очень важно привести ребёнка в процедурный кабинет, где ставили пробу, медсестра измерит прозрачной миллиметровой линейкой диаметр инфильтрата. От результата пробы зависит дальнейшая тактика врача по предупреждению заболевания туберкулёзом.

ЕСЛИ ПРОБА НЕ ПРОВОДИЛАСЬ ИЛИ РЕЗУЛЬТАТ НЕ ПРОЧИТАН ЧЕРЕЗ ТРОЕ СУТОК, НИ ВРАЧ, НИ РОДИТЕЛИ НЕ ЗНАЮТ, ЕСТЬ ЛИ УГРОЗА ЗАБОЛЕВАНИЯ ТУБЕРКУЛЁЗОМ ДЛЯ РЕБЕНКА!

Для выявления туберкулеза у детей проводятся туберкулиновые пробы 1 раз в год.

НО ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ДЕТЕЙ ВНУТРИКОЖНЫЕ ПРОБЫ ДОЛЖНЫ СТАВИТЬСЯ 2 РАЗА В ГОД, ЭТО:

- ✓ дети, не привитые вакциной БЦЖ;
- ✓ дети больные сахарным диабетом;
- ✓ дети с заболеваниями желудочно-кишечного тракта;
- ✓ дети, длительно болеющие респираторными заболеваниями, заболеваниями легких;
- ✓ ВИЧ-инфицированные дети.

ВЫПОЛНЯЙТЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ВРАЧА.

Если вам дано направление к врачу-фтизиатру, обязательно посетите его и принесите участковому педиатру или медработнику образовательного учреждения заключение фтизиатра.

Детям подросткового возраста с 15 лет дополнительно к пробе с Диаскинтестом проводят флюорографическое обследование органов грудной клетки.

#Ты СИЛЬНЕЕ
МИНДРАВ
УТВЕРЖДАЕТ!

8 800 200 0 200
TAKZDOROVU.RU

